

Introkurs økologisk frukt

28.10.2020

ved Marianne Bøthun, NLR Vest



**Norsk
Landbruksrådgiving**



Tema: **Frukt** eller **bær**?

- **Planlegging**- bruk tid nok
- **Modningtid** – direktesal eller grossist
- **Logistikk** – små eller store volum, ferske eller foredla
- **Førebyggende arbeid** – jord/planter/drifts-opplegg & ressursar

Ting Tek Tid!



Nye og tradisjonelle vekster; Tindved, Svarthyll, Eldkvede, Blåleddved m.fl. gjerne i nye smaskombinasjonar med frukt



Planteproduksjon, økologiske arealer, fylkesvis 2019

Kilde: www.debio.no

Fylke	Eng og innmarks-beite	Grønn- gjødsling	Korn	Engfrø og annet frø	Poteter	Grønnsaker (inkl. erter/bønner og veksthus- kulturer	Urter	Frukt	Bær	Annet	Totalt, øko
Østfold	29191,40	975,40	17453,70	0,00	63,00	398,700	1,00	175,60	19,10	2058,000	50335,900
Akershus/Oslo		940,30		136,00	63,80	196,960	12,56	59,60		971,300	36452,520
	25723,80		8292,30						55,90		
Hedmark	36944,95	506,60	4717,30	90,45	301,70	458,650	3,40	12,20	81,90	707,700	43824,850
Oppland	16995,00	280,00	2737,50	0,00	127,80	473,040	34,70	3,70	83,70	388,300	21123,740
Buskerud	23505,30	1206,50	6542,40	175,00	17,50	593,450	15,50	86,90	191,60	675,600	33009,750
Vestfold	17371,40	183,50	5481,90	1428,70	408,10	1092,810	11,00	2,00	15,92	982,870	26978,200
Telemark	12649,66	166,70	2144,30	35,00	19,60	106,790	5,60	355,51	270,90	254,600	16008,660
Aust-Agder	5485,60	19,20	10,00	9,00	6,00	4,800	0,80	5,50	3,30	53,900	5598,100
Vest-Agder	5613,50	0,00	0,00	0,00	10,20	20,850	0,60	25,20	26,30	190,400	5887,050
Rogaland	6687,60	10,20	61,00	0,00	37,00	89,130	4,20	38,40	42,10	39,000	7008,630
Hordaland	7897,50	1,70	13,50	0,00	4,00	27,600	1,95	418,90	10,50	98,800	8474,450
Sogn og Fj.	13677,80	21,00	3,00	0,00	12,00	15,600	7,75	506,60	75,90	83,700	14403,350
Møre og R.	16559,40	12,00	99,20	0,00	18,45	8,050	8,85	74,30	18,55	187,300	16986,100
Trøndelag	85369,22	416,40	12434,08	79,90	106,30	304,070	4,20	45,00	86,23	799,715	99645,115
Nordland	19727,65	1,20	67,30	0,00	12,20	6,125	2,80	13,00	8,70	562,400	20401,375
Troms	6048,70	0,00	0,00	0,00	53,80	19,160	1,00	0,00	43,30	326,700	6492,660
Finnmark	580,80	31,90	7,00	0,00	1,00	7,300	0,25	0,00	0,05	10,200	638,500
Totalt*	330029,28	4772,60	60064,48	1954,05	1262,45	3823,085	116,16	1822,41	1033,95	8390,485	413268,950

*På grunn av bruk av 2 desimaler etter komma vil det være enkelte totalsummer med små differanser

Litt tal frå Debio per 31.12.2019

- **Det er 194 stk økoeple produsentar i Noreg totalt**
86 stk i Vestland, 43 i Viken, 38 i Vestfold & Telemark (+ 27 stk div.)
- **Det er 86 stk økoplomme produsentar i Noreg totalt**
53 stk i Vestland , 12 stk i Vestfold & Telemark, 11 i Viken (+ 10 stk)
- **Det er 47 økopære produsentar i Noreg totalt;** 32 stk i Vestland (+ 15 stk)
- **Det er 29 øko morell/kirsebærprodusentar i Noreg totalt**
4 i Møre & Romdsal og Viken, 3 stk i Vestfold & Telemark

Tal økoprodusentar er totalt 2113 stk. Øko (inkl. karensareal) utgjer totalt 4,6 % av samla jordbruksareal.

2019: Statistikken til Debio viser at det er over 1822 daa økologisk og karensareal for frukt samla. Vestland har 926 daa av dette, Vestfold & Telemark 358 og Viken 322.

Produksjon og forbruk av økologiske jordbruksvarer

Rapport for 2019

Rapport nr. 19/2020
16.03.2020



Landbruksdirektoratet
Kjellerstrasse 10
0403 Oslo

Marknad for økologisk 2019

- Produksjonen av de fleste økologiske jordbruksvarer gikk ned i 2019 sammenliknet med året før. Unntaket er økologiske egg, som har økt årlig siden 2012.
- Størrelsen på det økologiske jordbruksarealet gikk ned i 2019. Arealet økte fram til 2012, men har siden gått ned årlig. 4,2 prosent av jordbruksarealet var økologisk i 2019. Andelen økologisk var dermed lik som i 2018
- Omsetningen av norske økologiske **frukt**, grønnsaker og poteter til grossist gikk til sammen ned med 3 prosent.
- Samtidig som omsetningen gjennom grossistene reduseres viser Debios tall en økning i det økologiske arealet til poteter, grønnsaker **frukt og bær**.

Tabell 11: Dekar økologisk areal til poteter, grønnsaker, frukt og bær i 2014 og 2018–2019 samt endring siste år og andel økologisk areal.


Kultur	2014	2018	2019	Endring siste år, prosent	Andel økologisk av totalt areal
Poteter	918	1 167	1 263	8 %	1,1 %
Gulrot	855	885	840	-5 %	4,7 %*
Kålrot	76	149	199	34 %	
Andre frilandsg grønnsaker	1 188	2 327	2 365	2 %	
Diverse veksthuskulturer	136	148	172	16 %	
Sum grønnsaker	2 255	3 508	3 576	2 %	4,8 %
Epler	1 324	1 306	1 303	0 %	8,7 %
Annen frukt	438	495	520	5 %	7,6 %
Jordbær	64	70	69	-3 %	0,5 %
Andre bær	515	852	966	13 %	13,3 %
Sum frukt og bær	2 340	2 725	2 856	5 %	6,8 %

* Andelen inkluderer alle frilandsg grønnsaker inkl. gulrot og kålrot.

Kilde: Debio, per 31.12.2019. Andelen økologisk er beregnet ved bruk foreløpige arealtall fra SSB. Jordbruksareal i drift, ekskludert karensareal.

Oversikt over omsetning totalt og økologisk for de siste to årene ligger i vedlegg til denne rapporten.

Eplesesongen 2019 var den beste siden 2008, med en rik fruktblomstring og store avlinger.... På tross av den store avlingen var det en nedgang i omsetningen av økologiske epler direkte til forbruker. (Pga. presslevering?) I 2019 ble det produsert 112 tonn med økologiske plommer, men kun 11,5 tonn ble omsatt som økologiske 😞.



Figur 24: Omsetning av økologiske plommer og epler i 2014–2019 og andel økologisk av totalen. Tonn og prosentandel.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Tabellen viser prognose for 2020 i tonn samanlikna med avlingane frå 2010 til 2019 – i tillegg har vi prognose for sesongen 2023.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prognose 2020 pr1.9	Prognose 2023
Eple	7585	5254	5910	6 754	7 740	5 205	7 632	6 877	7469	8302	5810	10 033
Pærer	220	191	170	120	250	109	147	159	444	281	376	500
Plommer	1039	922	818	1 290	1 143	1 174	1 165	1 709	1527	1959	483	1 919
Moreller	329	359	405	488	583	384	491	447	668	496	397*	880
Sum	9 173	6726	7303	8 652	9 716	6 872	9 435	9 192	10 108	11038	7066**	13 332

*I tillegg har vi nokon som ikkje leverer til fruktlager

**I tillegg vil marknaden ta imot ca 500-600 tonn frukt utanom fruktlagera.

Økofrukt 2019:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plomme	13	15	11	12	31	18	31	44	40(9)	112(11,5)*
Eple	43	44	67	108	118	60	95	85	79	86

*Det vart produsert 112 tonn med Øko-plommer, men berre 11,5 tonn vart selde som det.

Tal frå
Fruktlager
inspektør Leif
Øie i GPS for
1.10.2020 og
øko i 2019.

Økofrukt 2018:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plomme	13	15	11	12	31	18	31	44	40(9)*
Eple	43	44	67	108	118	60	95	85	79

*Det vart produsert 40 tonn med Øko-plommer, men 9 tonn vart solgt som det.

Lofthus 26.01.2019


Leif Øie

I.flg. Landbruksdirektoratet sin nye rapport «Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport for 2018» så gjekk salet av økologisk frukt og grønt litt ned i 2018. Tala er hovudsakleg basert på omsetning gjennom Bama, Coop og Øko-kompaniet.


Forklaring til Fruktlagerinspektøren er lukka emballasje på plommer som slo feil og at det er godt betalt også å levera eple til jus.

Økologisk bær er lite og blir hovdusakleg seldt direkte/via smågrossistar.


Kva kan ein så forvente av avling i økologisk frukt; her eple som døme



Figur 4: viser teoretisk avling pr daa. Treantallet vil variere mellom plantesystema frå litt over 100 til 300 tre/daa.



Figur 3: viser sammenstilling av faktisk avling pr tre. Det var 5 tre pr gjentak unntak av felt i Vestfold med 6 tre tilsammen.



Grafen viser den store variasjonen. Avling pr tre er heller ingen god målemetode sidan antall tre varierer veldig i felta. Lågast avling er det i Vestfold.



Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Vi bidrar i prosjekter for:

Oppstart av bedrift

Internasjonal satsing

Innovasjon og utvikling

Landbruk

www.innovasjon norge.no + Landbruk + Tradisjonelt landbruk



Kalkylar
Siste melding: Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)
Introduksjon
Økologisk frukt
Eple standard
Eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonell frukt
Eple standard
Plommer standard
Eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Moreller
Konvensjonell bær
Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Bringe bær levert til konsum

Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt

Utfør kalkyle

Prosedyren er:

- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert



Registrerte kalkylar

Særskilte prioriteringer for 2020

- frukt-, grønt- og veksthusnæringa.
- tørke- og lageranlegg i kornproduksjon.
- små og mellomstore bruk.
- innen melkeproduksjon bruk med 15 – 30 kyr.
- økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av implementeringen av EUs økologiregelverk.



Viktig å vere klar over!

- Ein må no søke sin produsentorganisasjon om tillatelse til å plante nytt av frukt; høvesvis Gartnerhallen eller NorGrønt.
- Dei gjev også uttale om sortar som er aktuelle.
- Produksjonsplanlegging!
- Innovasjon Norge må søkast før ein utfører arbeid i felt/ kjøper inn driftsmiddel og planter
- Innovasjon Norge har ordningar både for større satsingar og meir småskala. Sjekk med eigen regionavdeling av IN.

Produksjonstilskot i landbruket

Den som aktiv driv ein gard kan søka tilskot til areal, dyr og avling + div. velferdsordningar.

Søknadsfristar er 15.mars (med teljedato 1.mars) og 15.oktober (med teljedato 1.oktober).

Arealtilskotet per daa = kulturlandskapstilskot + tilskot kultur + evt. øko

5.3.5. Om kulturlandskapstilskudd

I tillegg til arealtilskudd kan du få kulturlandskapstilskudd for areal med disse vekstene:

- Grovfôr
- Korn
- Potet
- Grønnsaker
- Fukt
- Bær

Det gis også kulturlandskapstilskudd for økologisk areal med grønnmjødsling og areal i 2. års karens med grønnmjødsling. Kulturlandskapstilskuddet beregnes ut fra opplysningene som er oppgitt i seksjonen «Areal – vekster», og er ikke noe du skal føre opp spesifikt i søknaden.

5.8. FRUKT, BÆR, GRØNT OG POTET

5.8.1. Registrering av frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) **Du kan søke om distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker dersom du har solgt:** • frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) • produkter som er laget av frukt, bær og veksthusgrønnsaker • matpotet i Nord-Norge • produkter som er laget av matpotet som foretaket har produsert i Nord-Norge I søknadsskjemaet fører du opp antall kg råvare du har solgt i søknadsåret. Dette gjelder uavhengig av om du har solgt råvare eller om du har solgt bearbeidet vare. Dersom du har solgt bearbeidet vare, må du regne ut hvor mye råvare som har inngått i de bearbeidede varene du har solgt, fordi det kun er råvaren som gir grunnlag for tilskudd (se eksempel under). Det gis kun tilskudd for varene første gang de omsettes. Du skal ikke føre opp kassabel vare, det vil si vare som er av en så dårlig kvalitet at den ikke kan benyttes til konsum eller i videreforedling. Dette gjelder uavhengig av om varen er solgt eller ikke.

5.8.5. Minste- og maksimalkvantum for tilskudd

For å motta tilskudd må du ha solgt et minstekvantum av varer. Dersom du søker om mindre enn disse mengdene, så vil du ikke motta tilskudd for dette. I tabellen under framgår disse minstegrensene.

Produkt	Minstekvantum
Samlet for frukt og pressfrukt (kode 001-006)	2 000 kg
Bær (kode 011-021)	1 000 kg

Tabell 7.9 Foreløpig sats for kulturlandskapstilskudd, kroner per daa jordbruksareal

	Søknadsfrist	Sats kr/daa ¹⁾
Kulturlandskapstilskudd	15. oktober 2020	166

1) Vekstgrupper på areal som i sum er mindre enn ett daa er ikke tilskuddsberettigede.

Tabell 7.10 Foreløpige satser for arealtilskudd, kroner per daa jordbruksareal

Vekstgruppe	Søknads- frist	Sats kr/daa ¹⁾ i sone ²⁾							
		1	2	3	4	5A	5B	6	7
Grovfôr	15. oktober 2020	0	0	85	105	273	318	318	364
Korn		217	282		322	276			
Potet		363						1 115	
Grønnsaker		750						1 750	
Frukt		1 200				1 950			
Bær		1 300				1 750			

1) Vekstgrupper på areal som i sum er mindre enn ett daa er ikke tilskuddsberettigede.

2) Soner i henhold vil vedlegg 1.

Definisjoner av vekstgrupper:

- *Grovfôr*: Fulldyrka eng, overflatedyrka engareal til slått og beite, innmarksbeite, nepe, kålrot til fôr, fôrbete, raigras, fôrraps, fôrmargkål, grønnfôrnepe og øvrige grønnfôr- og silovekster
- *Korn*: Hvete, rug, rughvete, bygg, havre, oljevekster, erter og bønner til modning eller konservering, engfrø og annet frø til modning, korn til krossing
- *Potet*: Potet
- *Grønnsaker*: Matkålrot og grønnsaker på friland (inkl. urter og karve)
- *Frukt*: Epler, pærer, plommer, moreller, kirsebær, andre fruktarter
- *Bær m.m.*: Jordbær, bær, planteskoleplanter⁴ for salg og blomster for salg dyrket på friland

Arealtilskudd til økologisk jordbruk

Tilskudd gis for økologisk areal og for arealer som er under omlegging (karensareal) som foretaket disponerer og driver aktivt i vekstsesongen. Dersom flere foretak har drevet det samme arealet aktivt i vekstsesongen, gis tilskuddet til det foretaket som disponerte arealet 1. august. Bestemmelsene i kapittel 7.7.3 om fastsetting av tilskuddsberettiget grovfôrareal per foretak gjelder også for økologisk arealtilskudd.

Tabell 7.15 Foreløpige satser for beregning av økologisk arealtilskudd

Vekstgrupper¹⁾	Søknadsfrist	Sats kr/daa
Frukt og bær m.m. ²⁾	15. oktober 2020	1 650
Grønnsaker ²⁾		1 650
Potet ²⁾		800
Korn ²⁾		382
Grovfôr ²⁾		25
Areal i 1. karensår ³⁾		150

1) Se definisjonene av vekstgrupper under kapittel 7.8.1.

2) Inkludert arealer i 2. karensår (og ev. 3. karensår for frukt- og bærarealer).

3) Alle vekstgrupper.

Dette tilskotet kjem i tillegg til kulturlandskaps- og areltilskotet per kultur. For dette er det ingen sone inndeling og det er såleis likt for heile landet.

6.6.2 Grunnlag for tilskudd

Grunnlaget for distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge, er produkter som foretaket har omsatt i perioden 1. januar til 31. desember året før utbetalingsåret.


Soner for distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker er lik soner for arealtilskudd, jf. vedlegg 1. Distriktstilskudd for potetproduksjon gis for poteter dyrket i Nord-Norge. Dersom foretaket har produksjon av samme vekst på areal i forskjellige soner, gis tilskudd etter den sonen hvor foretaket har størstedelen av sitt tilskuddsberettigede areal av veksten, etter kapittel 7.7.1.

Foretak som samlet leverer under følgende minstekvantum er ikke tilskuddsberettiget:

Tabell 6.13 Satser for distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker

	Kvantumsgrense per foretak	Sats 2021¹⁾, kr per kg
<i>Epler, pærer, plommer, kirsebær</i>	ingen avgrensing	
Sone 1		3,15
Sone 2-4		4,41
Sone 5		9,00
<i>Moreller</i>		
Sone 1		4,18
Sone 2-4		5,42
Sone 5		10,04
<i>Pressfrukt</i>		3,15
<i>Bær</i>		
Sone 1-3		2,36
Sone 4-5		6,44
Sone 6-7		7,40

For å bli økogodkjent/ sertifisert i Noreg, må ein melda seg inn i Debio



På deira nettside finn ein rettleiarar og regelverk for økologisk drift

The screenshot shows a web browser window with the URL debio.no/vare-arbeidsomrader/. The page features a grid of nine cards, each representing a different area of organic farming. Each card includes a title, a brief description, and two links: 'LES MER >' and 'SØK NÅ >'. The cards are: Landbruk, Servering, DebioInfo, Foredling, import og omsetning, Valørmerke matvarehandel, Matvalget, Akvakultur, Bærekraftig fiske og fangst, and Regelverksarbeid. The website is in Norwegian and is part of the Norsk Landbruksrådgiving (Norwegian Agricultural Advisory Service).

Våre arbeidsområder - Debio

debio.no/vare-arbeidsomrader/

Apper Norsk Landbruksrådgiving

Landbruk

Produserer og omsetter du økologiske og biologisk-dynamiske landbruksprodukter, trenger du en godkjenning fra Debio.

[LES MER >](#) [SØK NÅ >](#)

Servering

Lager og serverer du mat til andre, og ønsker å markedsføre din servering av økologisk og bærekraftig mat, kan du synliggjøre satsingen med Debios valørmerker eller Ø-merket.

[LES MER >](#) [SØK NÅ >](#)

DebioInfo

DebioInfo formidler kunnskap og gir veiledning knyttet til Debios merker. Vi skaper møteplasser for felles undring og endring.

[LES MER >](#)

Foredling, import og omsetning

Produserer, tilbereder, lagrer, importerer eller markedsfører du økologiske eller biodynamiske matvarer, trenger du en godkjenning fra Debio.

[LES MER >](#) [SØK NÅ >](#)

Valørmerke matvarehandel

Driver du med matvarehandel og ønsker å markedsføre salg av økologisk og bærekraftig mat, kan du synliggjøre satsingen med Debios valørmerker.

[LES MER >](#) [SØK NÅ >](#)

Matvalget

Matvalget hjelper deg som vil lage økologisk og bærekraftig mat til andre. Vi tilbyr kurs, veiledning og studieturer for å gjøre det enklere å ta gode matvalg.

[LES MER >](#)

Akvakultur

Bærekraftig fiske og fangst

Regelverksarbeid

Skriv her for å søke

11.11 28.10.2020



Regler for merker og merkebruk



Landbruk



Foredling, import og omsetning



Valørmerker servering



Valørmerker matvarehandel



Akvakultur



Bærekraftig fiske og fangst



Juletrær og pyntegrønt



Snittblomster og potteplanter til pynt



Kosmetikk





På Debio sine nettsider finn ein regelverk for øko:

- Mål for økologisk
- Regelverk
- Tilknytting og sertifisering
- Gebyr
- «Rettigheiter og plikter»
- For planter, husdyrhald, birøkt
- Vedlegg: godkjente innsatsfaktorar som gjødsel, plantevern

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

Veileder til økologiforskriften
(forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske
landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr av
18.03.2017 nr. 355)

Regelverksveileder

Økologisk landbruk

Utfyllende informasjon om regelverket
for økologisk landbruksproduksjon

Versjon 16. juni 2020

2 ØKOLOGISK PLANTEPRODUKSJON 18

2.1	Arenene må godkjennes	18
2.2	Karenstiden varierer etter hvilke plantekulturer som dyrkes.....	18
	Unntak fra reglene om når karenstiden starter	19
2.3	Parallellproduksjon – regler for å drive konvensjonelt og økologisk samtidig	20
	Hva er parallellproduksjon?	20
	Når er det tillatt med parallellproduksjon?	20
	Vær oppmerksom når du dyrker ulike sorter av samme art.....	20
	Krav om ulike sorter ved parallellproduksjon av flerårige vekster	21
	Unntak fra krav til ulike sorter i økologisk og konvensjonell produksjon:	21
2.4	Næringstilførsel i økologisk landbruk.....	22
	Vekstskifte skal øke jordas fruktbarhet og biologiske aktivitet.....	22
	Hvordan gjødle i økologisk produksjon.....	22
	Hva kan du bruke av ikke-økologisk gjødsel?.....	23
	Bruk av matavfall	23
	Bruk av fiskebiproduktet grakse.....	23
	Slik dokumenterer du behovet for ikke-økologisk gjødsel	23
	Følgende organiske gjødelslag er ikke tillatt:	23
	Hvilke råvarer kan brukes til biogassproduksjon (biorest)?	24
2.5	Hvordan regulerer du ugras, skadedyr og sykdommer?	24
2.6	Formeringsmaterialet skal være godkjent	24
	Frø og settepotet	25
	Vegetativt formeringsmateriale utenom settepotet.....	25
	Skal du produsere frø, såvare og vegetativt formeringsmateriale?.....	25
2.7	Krav til vekstmedium i potter, kar og benker.....	26
2.8	Krav til økologisk veksthusproduksjon	26
2.9	Hosting av planter og plantedeler fra utmark	27
2.10	Økologisk sopp	27

NLR tilbyr ulike produkt og produkt-pakkar (til medl.) innan økologisk drift

Det blir halde ulike kurs/ markdagar/ samlingar der økologisk er integrert

Nybyrjarkurs i frukt regelmessig i kvar region (evt. som webinar)

Mentorordning for heile landet

Plantevern møter og autorisasjonskurs

Skjeresamlingar i stein- og kjernefrukt

Samarbeid med frukt- og bærmottak

Me yter også hjelp til IN-søknader



**Norsk
Landbruksrådgiving**

Vi tilbyr rådgiving i økologisk produksjon



NLR Økologisk Førsteråd

Tilbud om gårdsbesøk med vurdering av muligheter for omlegging til økologisk drift

- Skriftlig tilbakemelding og tilbud om oppfølging
- Gratis og uforpliktende



NLR Økologisk Økoplan

Tilbud til deg som ønsker hjelp ved innmelding i Debios kontrollordning

- Utarbeiding av Økoplan
- Gratis



NLR Økologisk Rådgivingsavtale

Tilbud om skreddersydd og tett faglig oppfølging

- Inntil ti timer rådgiving tilpasset dine behov
- Ulike fagtema: grovfôr, beitebruk, byggteknikk, maskinløsninger m.m.
- Pris: 250 kroner per time



NLR Økologisk Grupperåd

Tilbud om å delta i faglige samlinger, for eksempel markdager

- Rådgiving og erfaringsutveksling
- Faglig og sosialt fellesskap

Vurderingsfasen

NLR Økologisk Førsteråd
Gårdsbesøk med vurdering av muligheter for omlegging til økologisk drift

Igangkjøringsfasen

NLR Økologisk Økoplan
Veiledning og tilpassing til regelverk og dokumentasjon for innmelding i Debios

Driftsfasen

NLR Økologisk Rådgivingsavtale
Skreddersydd rådgivingspakke, inntil 10 timer

NLR Økologisk Grupperåd
Møteplass for gårdbrukere, rådgivere, forskere og markedsaktører

Les mer på nlr.no eller kontakt din rådgivingsenhet!

Kompetanse for framtida

Etablering av ei fruktplanting

Økologiske og konvensjonelle metodar

Førebuing av jorda
Ugraskontroll
Plantearbeidet
Oppstøttingssystem
Vatningsanlegg



Dyrkingsmanual

Stell og drift av tettplantingar

Konvensjonell og økologisk drift

Skjering
Vekstkontroll
Plantevern
Næringstilførsel
Vatning
Hausting



Dyrkingsmanual

Gjødsling i frukthagar

Konvensjonell og økologisk produksjon

Tidspunkt
Mengde
Type gjødsel



Dyrkingsmanual

Mekanisk ugrashandtering i frukt

Konvensjonell og økologisk drift

Etablering
Tidsforbruk
Type freser
Praktiske erfaringer




Prøving av nye pæresortar i økologisk dyrking

Tatt av Foto: Dag Røen og Siri Harald Hjeltnes, Gårdsas / Njøs Næringsmiddel AS

Ein del nye og eldre pæresortar er prøvde ut i økologisk dyrking på Njøs. Den nye sorten 'Kristina' ser ut til å vera svært godt eigna for økologisk dyrking.

Det var mange sorter med i prøvinga, men her blir berre omnekt 6 sortar: 'Kristina', 'Regnbue', NP 2870, NP 2870 og NP 3043, ein som er julepære, 'Stylen' på As (Anna), 'Conferenc' og 'Konferenc' på Njøs.


Om forøvrigt
I 1999 var det planlagt grøntskole av 15 pæresortar på Njøs ved Njøs Frukt og Bær i Sogn. Det var planlagt 4 m per sort (2 gjentak 3,2 m), og plantesamsetning var 1,67 x 4 m. I løpet av sju år har grøntskolen vorte økologisk dyrking, og var i 2004 i fullt utbygging. I løpet av sju år har det vorte plantet 1000 pæretre, og var gjekk medverka helsestasjon ved planting (0,5 kg/m² og 1,002



Figur 2. Gjennomsnittlig utbytte for 2007-2008, avrundet til kg/ha.

0,5 kg/m², noko som gav svært god utbytte. Utbyttet var berre med gjennomsnittet med spesialitet i 500 kg/ha. Utbyttet var berre med gjennomsnittet med spesialitet i 500 kg/ha. Utbyttet var berre med gjennomsnittet med spesialitet i 500 kg/ha.

I det første året etter planting (2001-2004) var det høye utbyttet, og var det av dei pæresortane som høyrte til høye utbytte, og var det av dei pæresortane som høyrte til høye utbytte, og var det av dei pæresortane som høyrte til høye utbytte.



Figur 1. Høstet utbytte for 2007-2008 (1. og 2. år etter planting).

Plommesortar for økologisk dyrking




Ein rapport utarbeidd av Dag Røen

Leikanger 2007

NORSØK
Småskrift
Nr. 1/2004

ØKOLOGISK LANDBRUK


- RIPS
- SOLBÆR
- STIKKELSBÆR



Muligheter for økologisk
bringeberproduksjon i Norge



Jordbær dyrking i økologisk landbruk



DYRKINGSRETTLEIING

Årsak Dyrking
Anbefalt Hest
Gode Løse Verktøid
Mai 2017

Norsk
Landbruksrådgiving

Produksjonsplanlegging - frukt

- Jord/ klima/ arrondering – kva har du tilhøve for
- Storleik på produksjon – direkte sal eller via grossist
- Tilgong på haustehjelp (steinfrukt må raskt av)
- Bustad/ sanitæranlegg (om leigehjelp)
- Sortsval; ulike krav om til direkte eller volumsal
- Val av kulturmåte; friland eller tunnel for t.d. morell
- Steinfrukt (som plomme) må haustast fleire gonger i veka
- Akkord/ timebetaling
- Utvida sesong (skulder sesongar); tidlege/seine sortar
- Innkøyring frå felt fleire gonger per dag
- Stå i skuggen og/eller rask kjøling (h.v. kjerne-/steinfrukt)

Val av areal og førebuing før planting

- Ideelt er sydvendt helling, på lettdrenert jord og ikkje for vindutsett
- Vurder arrondering, grøfting og/eller leplanting
- Ta jordprøvar for å få vita næringstilstand og pH i jorda; gjødsla opp/kalka før planting (møkk/kompost)
- Plant på frisk jord og bruk vekstskifte; hjelper mot jordtrøytteleik, ugras, skadedyr m.v.
- Velg friskt plantemateriale (sertifisert); økologisk eller dispensasjon for konvensjonelt
- Ha eit opplegg/plan for vatning, gjødsling, ugras og plantevern
- Evt. viltgjerde om jordbær eller frukt
- **Ikkje slurv med dette!**

Gårdskart på nett; NIBIO på: www.nibio.no Eit svært nyttig hjelpemiddel!

Browser address bar: <https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/1417/140/8/0>

Gårdskart - NIBIO

Gårdskart

Vi får ikke kontakt med Landbruksdirektoratet sin database (LiB). Vi henter derfor data fra tidligere nedlastede data for å vise Gårdskart. Eventuelle endringer i LiB etter denne datoen vises ikke i kartet. Gjelder 1417-140/8/0 (verifisert 15.01.2019)

Nytt søk

Landbrukseiendom - 1417-140/8/0
Viser 13 av 14 teiger

☐ Vis alle

Gårdskart

- ☒ Markslag (AR5) 7 klasser
- ☐ Markslag (AR5) 13 klasser
- ☐ Erosjonsrisiko
- ☐ Jordressurs
- ☐ Helling jordbruksareal
- ☐ Gårdskart uten tema

☒ Gårds- og bruksnummer

☒ Driftssenter landbrukseiendom

☐ Alle driftsentre

Bakgrunnskart

- ☒ Gråtoner
- ☐ Farger
- ☐ Raster
- ☐ Flybilder
- ☐ Ingen bakgrunn
- ☐ Eldre flybilder

Map showing terrain, roads, and land parcels. Labels include: dalen, Vigdalen, Juvik, Mula-613, Fresvik, Hov, Hovs-fjellet, Tufta-fjellet, Helgedalen, Ivarli, Otrehjell, Gagersnes, Frønningen, Nyborg, Åsen, Sagelvi, Buene, Simlenes, Daurmål, Storebotnen, Målestokk = 1:72143, UTM 32, Ø: 400855, N: 6775906.

2 km

Arealfordeling


Arealfordeling på teignivå

Matrikelnummer	Antall teiger	Fulldyrka jord	Overflatedyrka jord	Innmarksbeite	Produktiv skog	Annet markslag	Bebygd, samf., vann, bre	Ikke klassifisert	Sum grunneiendom
1417-140/8 Areal i dekar									
1417-140/8	13	44.5	4.8	120.6	1 695.8	506.5	12.8	0.0	2 385.0

Windows taskbar: 12.05 09.04.2019



Nokre faktorar kan me få gjort noko med, andre ikkje. Garden ligg no eingong der den ligg.... Me må prøve å velje vekster som høver.



Krav til klima hos sorter av viktige frukt- og bærslag og kritiske faktorer for adaptasjon

Dag Roen og Anita Sonsteby

Njøs næringsutvikling AS - Rapport No. 9

Jordsmonn kart og evt. kartlegging av temperatur, lystilhøve, nedbør m.v. kan gje nyttig informasjon. Sjå t.d.:

www.vips-landbruk.no

Epler til økodyrking v Dag Røen 2008

Nokre nøkkeldata for tilrådde sortar

Sort	Haustetid:		Brukstid:				Mottakelegheit sjukdomar			Avling	Frukt- storleik	Veksekraft hos treet	Salskanal / bruksområde		
	aug.	sept.	okt.	nov.	des.	jan.	Skurv	Kreft	Mjøldogg				Grossist	Direktesal	Anna
Nanna							••	?	••••	•••	••••	•••		X	
Katinka							Vf • / •	••	••	•••	••	••••	X	X	
Idunn							•	?	••	•••	••••	••••		X	
Ingelin							Vf • / ?	?	••••	•••	•••	••••	X	X	
Discovery							•	•••••	•	••	•••	•	X	X	
Katja							•	?	•	••••	••	••	X	X	
Witos							Vf • / ?	?	••	••••	••••	••••			juice
Rubinola							Vf • / ••	••	••	•••	••	•••••	X	X	
Filippa							•	•••	••	•••	•••	•••		X	
Raud Aroma							••	•••	••	••••	••••	•••	X	X	
Rubin							•	?	•	••	••••	••	X	X	
Rubinstep							••	••	••	••••	•••	•••	X	X	
Raud Ingrid Marie							••	••••	•••	••••	•••	•••	X	X	

	Tilrådd som hovudsort
	Tilrådd som prøvesort
	Tilrådd som spesialsort

	Sjukdomar	Avling / fruktstorleik	Veksekraft
•	Lite utsett	Svært liten	Svaktveksande
•••	Middels utsett	Middels	Middels sterktveksande
•••••	Svært utsett	Svært stor	Sterktveksande
?	Manglar opplysningar		
• / •	Skurvmottakelegheit hos Vf-sortar før / etter brot av Vf-resistens		

Det er viktg også å tenkje
sortar som kan bestøve
kvarandre og evt. om mogleg
innleige av bikuber e.l.

OBS: visst ein skal ha bær og frukt, samt fleire sortar vil dei overlappa i modningstid!!!




Det finst standardar for korleis gode planter skal sjå ut; både Norsk Standard for ulike sortar og klassifiseringar frå det store utland. Mykje bli no importert.





**Frå meir
ekstensiv til
intensiv drift**





IFTA

APPLE ORCHARD SYSTEMS



Editor Bruce H. Barritt
INTERNATIONAL FRUIT TREE ASSOCIATION




Min «gamlehage» frå 2004 var planta på mypex med 2 x 4,5 m avstand og spredarvatning. Me plantar no moderne tettplanting ca 90 cm x 3,5 m uten mypex og med dryppvatning.



**Norsk
Landbruksrådgiving**



Henta frå
boka Frukt-
dyrking av
Atle Kvåle



Eksempler på espaliérsystemer til frugtdyrkning Espaliérsystemet giver lys og luft til alle træets grene og øger dermed frugtkvaliteten.

Spindelssystem i æble og sødkirsebær

Række- og træafstand:

3-4 m x 0,8-1,4 m

(æble, 1786 – 4167 træer/ha)

4-5 m x 2,5 – 4 m

(sødkirsebær, 500-1000 træer/ha)


Mål: Alle arbejdsfunktioner kan udføres fra jorden.

Fordele: Plukning og høst er ret enkel.

Tidligere bæring. Kronen er let tilgængelig for håndarbejde.

Ulemper: Kræver intensiv pleje.

Stor investering.



Frå boka Frugt og bær dyrking
av Maren Korsgaard m.fl.



**Norsk
Landbruksrådgiving**

Skjering etter slank spindel prinsipp her demonstrert ved Aad Wisse.

«Ballerina tre» med juletreform for maks lys innstråling.

Brukar strengsystem med «bord» for basisgeinene for å forma trea.



**Norsk
Landbruksrådgiving**

Bilete frå NLR kurs i Hardanger og tapp-skjering i "vindauga" på treet



I det store utland med sine store flater og felt, har fleire gått over til maskinell skjering av rekkene/toppane.



**Norsk
Landbruksrådgiving**

Mekaniseringsutstyr kan vera stort og dyrt eller smått, billig og bra



Også for tynning i frukt, finst det mekanisert utstyr å få.
Handhelde eller traktormontert som Darwin t.h.



**Norsk
Landbruksrådgiving**

Ulike plattformar og plukkevogner kan nyttast både under beskjering og hausting. Nye sprøytetypar.



einfacher An- und Abtransport



platzsparende Lagerung



leichte Handhabung



perfekte Spurtrenn




robuste, einfache Technik



**Norsk
Landbruksrådgiving**

Økologisk kirsebær



Sigrid Mogan, NLR Viken

Kirsebær

- Søtkirsebær (morell) lite aktuell for økologisk dyrking
- Hovedutfordringer:
 - Bladlus
 - Råtesopper
 - Sprekking – krever tunnel/ annet værvern
- Surkirsebær
 - Få kjente øko-dyrkere, men det finnes erfaring med økoproduksjon
 - Nyplanting på Røyse i 2019 (10 daa)



Surkirsebær

- Mest vanlig er «industriproduksjon» med store felt som maskinhøstes. Treavstand 3 x 5 m. Bærene/ bærmassen samles i storkasser som leveres til presseri straks etter høsting
- Tidligere ble sterktvoksende grunnstamme brukt – frøstamme
- Nå er grunnstamme Colt mer vanlig
- Finnes et visst/ betydelig marked for selvplukk.
- Forsøk i Danmark med skjæring som til plomme – pyramidefasong (juletre) der sidegreinene skiftes ut, Trærne bør ikke bli for store, tettere planting: treavstand 2 x 4 m. Egner seg for håndplukking



Surkirsebær, konvensjonell planting

Bærene samles i storkasser ved maskinhøsting



Sorter

Fanal

Storfrukta, god bærkvalitet

Svak mot bakteriekreft

Kelleris 16

Nokså søt; krysning mellom søtkirsebær og surkirsebær

Omtrent samme fruktstørrelse som Fanal
sterkere mot bakteriekreft, men svakere mot monilia

Stevnsbær

Små frukter, men faste og lite utsatt for sprekking. God saftkvalitet. Kraftigvoksende trær.
Sterk mot bakteriekreft og grå monilia.
Modningstid: 20.-25. august.



Nyplanting på Røyse 2019

Ulike dekkesystemer i morell...



- og i andre kulturar



Pære

.. og bringebær



Kvifor alle desse tiltaka?


Betre konsum- og presskvalitet, meir rasjonelt system, større avling (kl 1) og dermed betre pris og lønsemt



Integrert plantevern



Alt heng saman med alt!
Rett tiltak til rett tid.



IPV – 8 prinsipp: **planteverntiltak**


1. Kjenn din fiende!
2. Bruk varsling, prognosar, skadetersklar
3. Ikkje-kjemiske tiltak om mogeleg
4. Skånsomme midlar
5. Førebygg
6. Tilpass dose
7. Motvirk resistens
8. Sjekk tiltak, virkar det?



Trong for tiltak?

- Økonomi
- Registrering/varsling

<https://www.vips-landbruk.no/>



Kontrollmetode		Tid											
		Utviklingsstadium											
													
		51	53	56	59	63	67	69	71	73	BBCH	Prøvestørrelse	Skadeterskel
Lepidoptera	Eplevikler											1 feromonfelle 1000 frukter H: 1000-2000 frukter	5-7 stk/uke/felle 0,5-2% angrep 1 % angrep ⁽¹⁾
	Bladvikler (overvintra larve)											33 greiner 100 kortskudd	20-25 larver 5-7 larver
	Bladvikler (overvintra egg)											33 greiner 100 kortskudd	8-10 larver 5-7 larver
	Liten fruktvikler											1 feromonfelle 1000 frukter H: 1000-2000 frukter	- 0,5-2% angrep 1 % angrep ⁽¹⁾
	Frostmåler											100 kortskudd	5-7 larver
	Nattfly											33 greiner 33 greiner 100 kortskudd	12-15 larver 8-10 larver 5-7 larver
	Spinnmøll											100 kortskudd 100 kortskudd	5-8 bladminérganger 3-5 reir
	Minérmøll											1 feromonfelle 200 blad	- 50-60% angrep
Homoptera	Eplebladgaieius											200 kortskudd 100 trær	5-10 kolonier 5-10% angrepne t.
	Eplegraslus											100 kortskudd	80 kolonier
	Grønn eplebladlus											100 kortskudd 100 langskudd	10 kolonier 10-15% angrep
	Rød eplebladlus											100 kortskudd	1-2 kolonier
	Vanlig pæresuger											100 langskudd 100 greiner 100 kortskudd 100 langskudd H: 1000 frukter	10-12% angrep 150-250 voksne 30-50% forekomst 30-60% forekomst
	Kommaskjoldlus											Greinprøver	30-50 skjoldlus/2 m
Diverse	Bladmidd											30 blad	6 blad m/midd på oversida
	Frukttremidd											100 blad	15-20 med flere enn 5 midd
	Eplesnutebille											33 greiner 100 kortskudd	10-20 biller 10-15 angr. enkeltbl.
	Lauvtrebarkbille											1 alkoholfelle	20 ind/felle/sekk
	Epleveps											3 hvite limfeller 250 frukter	20-30 veps/felle 3-5 % angrep
	Fruktteger											33 Greiner	1-3 teger

H: - Ved høsting




OBS: ser du maur i felt, så er det som ofte lus.

Over skadeterskel? Så kva gjer ein???

- Mekaniske tiltak?
- Biologiske preparat? (Plantestyrkande, «giftige»)
- *Kjemiske middel? (Breispektra/selektive)*
- Nyttedyr?

Førebygging (tidleg vår og året før)

- Insekthotell
- Fuglekassar
- Reinhold (soppsjukdommar/ugras)
- **(Planteval, gjødsling, kalking, vatning... Dermed er ringen slutta)**



Tidlegare ein eigen økoplantevernplan for eple (Agropub), no integrert i den «vanlege»

Tidspunkt	Skadegjerar	Tiltak	Merknader
Vinter/Tidleg vår	Soppsjukdomar generelt Skurv	Skjering for å opna trea, fjerna smittekjelder for sopp, Fjerna dødt lauv, rotskot	Bør gjerast når det er turt
Tidleg vår	Bladlus	Limring rundt stamma	Hindrar oppkryping av maur. Kan skada unge tre
Svellande knoppar	Grøn eplebladlus Raud eplebladlus	Raps/soyaolje (2l/100l) +grønsåpe (0,5-1/100l)	Punktsprøyt på skot med svarte egg
Grøn spiss	Frukttremidd	Raps/soyaolje (2l/100l) +grønsåpe (0,5-1/100l)	OBS! Bland såpe og olje saman før du har det oppi tanken! Mogleg verknad mot insektegg (td.kartviklar)
Frå musøyrestadiet og framover	Skurv	Svovel (Thiovit(300g/100l)) 450 g pr daa Bikarbonat (bakepulver) (750g/100 l)	Sjekk Rimpro! Sprøyt førebyggjande ved varsel om regn og sporekasting, Svovel verkar mot bladmidd Bikarbonat har kurativ verknad inntil 30 timar etter infeksjon

Forfatter. Bioforsk Rapport vol. X nr. YY 2002

3



April-mai	Epleveps	1 kvit limfelle pr 30-50m rad Ope jord/fresing langs radene	Utbreidd i Agder/Ryfylke Usikkert om verknaden er god nok
Bløming	Bladmidd	Svovel (Thiovit (150g/100l))	2 gonger i bløminga (sjå tiltak mot skurv)
Mai-august	Mjøldogg	Fjern infiserte toppar/ blomeklasar	
Juni	Epleviklar	Raps/soyaolje (2,5 dl/100l) +grønsåpe (1/100l)	Sjå VIPS! Truleg effekt Ikkje utbreidd på Vestl.
Ved funn på føresommaren	Grøn eplebladlus	Grønsåpe (5l/100lvatn)	Punktsprøyt på lusetoppar. Kan gje sviskade
Ved varsel	Rognebærmøll	Raps/soyaolje (2l / 100l) +grønsåpe (1l /100l)	Sjå VIPS! Fleire sprøytingar ved sterke angrep
Juni-august	Kalsiummangel / Prikksjuka og lagersjukdomar	Kalsiumklorid 250-500g/100l 4- 6 sprøytingar	NB! Dokumentasjon for behov Kan gje sviskade i varmt ver!
I løpet av juli	Rognebærmøll	Fjern klasar på rogn for å redusera møllpopulasjonen	Sjå VIPS! (frå 600 døgngrader etter full bløming hjå rogn)
I god tid før hausting	Epleviklar Liten frukttreviklar Grå monilia	Fjern eple med skade ut or hagen Fjern skadde skot	Reduserer populasjonen neste år
August - september?	Frostmålarar	Limring på stamma: 10 cm breitt plastband med lim 30- 40 cm over bakken	I herjingsperiodar.
Etter høsting	Soppsjukdomar generelt	Fjern resterande frukter frå hagen (på tre og nedfall)	Kan frese ned fruktene i trerekka.
Under bladfall	Frukttrekreft	Kalsiumhydroksid	Krev løyve frå Debio
Etter bladfall	Skurv	Fjerna, knusa eller fresa ned lauv	
Oktober/Nov	Raud eplebladlus	Raps/soyaolje (2l/100l) +grønsåpe (0,5-1/100l)	Usikker verknad

Tilsvarende finst for dei fleste kulturane i eldre eller nyare utgåver

NLR gjev råd kring planting, stell, plantevern, gjødsling, rett haustetid m.m.




Tiltak mot skadegjerner i økologisk fruktdyrking:
EPL



Plommer økologisk - Sjukdomar og skadedyr 2020

Behandlingstids- punkt	Skadegjører	Handels preparat	Mengde pr daa	Menode pr 100 liter (Riftespr.)	Merknad
Tidleg svellende knoppar	Plommepung	Nordox 75 WG	150 g	100 g	Bruk minst 50 l væske/daa eller 20 l pr. 100 m rad.
Svellende knoppar	Bakteriekreft, plommepung	Nordox 75 WG	150 g	100 g	Følg med på Mallard då den er tidleg ute. Bruk minst 50 l væske/daa eller 20 l pr. 100 m rad. Maks 400 g/daa/år.
	Egg av bladlus	Raps-/soyaolje + grønsåpe	3 l + 0,5 l	2 l + 0,35 l +	Best effekt på sprøyting er rett før eggja klekk- er. Oljeblanding: Først litt vatn, deretter olje + såpe (som er blanda før) under god omrøring på tanken før etterfylling.
Knoppbryting	Egg av frukttremidd	Fibro	2,25 l	1-1,5 l	Best effekt på sprøyting er rett før eggja klekker. Frukttremidd: Ta inn 2- årlige greiner til driving rundt svellende knopp. NB! Kun 1x per sesong.
Tett klynge	Plommepung	Nordox 75 WG	100 g	70 g	Størst problem på Vestlandet. Utsatte sortar er Edda og Mallard. Ved kaldt og fuktig vær, gjenta sprøytinga. Tidleg ute er betre enn for seint.
Ballong	Bladmidd	Thiovit	300 g	200 g	2 sprøytingar med 5-10 dagers mellomrom avhengig av temperatur. Skade mest utsatt på unge tre og på korkutsette sortar som Mallard.
Rett etter blomsting	Bladmidd	Thiovit	300 g	200 g	Sjå merknad ovanfor. Set ut limfeller for å følge med på skadedyr- tilstanden i frukthagen.
Selvare / ved åtak	Plommepung				Fjern kart
	Bladlus /mjøle plommebladlus/ humlebladlus	Natria konsentrat	1,5 l	1 l	NB! Er skadeleg for nyttefaunaen. Bør berre punktsprøytest.
	Bladmidd, frukttremidd	Thiovit	300 g	200 g	Sjå merknad ovanfor.
	Røtesopp på frukter	Vegsalt (kalsiumklorid) + Aminosol PS	750 g + 100 ml	500 g + 65 ml	Sprøyt 2-4 gonger. NB! Pass på at Aminosol er av type godkjent for spiselige vekstar; dvs. er plantebasert.
Selvast 2-3 veker før høsting – gjerne før	Plommebladmidd	Thiovit	300 g	200 g	Ved behov, gjenta etter ei veka.
Etter høsting	Bakteriekreft (hagskotsjuke på Vestlandet)	Nordox 75 WG	100 g	70 g	Dosering mellom 50-100 g. 1-3 sprøytingar i september- oktober. Maks 400 g pr daa/år.

For å t.d finna godkjente plantevernmidlar i økologisk må ein inn på Mattilsynet sine sider:



Preparatene er godkjent i henhold til forskrift om plantevernmidler av 14.12.2000, og inneholder virksomme stoffer som i følge EUs forordninger for økologisk landbruk kan tillates brukt. Listen er identisk med vedlegg 2 (Liste 2, B2) til regler for økologisk landbruksproduksjon. Bruk av yrkespreparater forutsetter autorisasjonsbevis. Der reg.nr. vises som en lenke, kan etiketten (i pdf-format) hentes fram ved å klikke på denne.



Sjekk alltid oppdatert liste hjå Mattilsynet, for endringar skjer også m.o.t. regelverk og kva som er tillatt.

Preparat	Virksomt stoff/ organisme	Yrkes/ hobby	Preparat type	Reg. Nr.	Kommentar
Conserve	spinosad: 120 g/l	Y	Skadedyrmiddel	2012.15.14	
Ferra Proff	Jern(III)fosfat: 10 g/kg	Y	Skadedyrmiddel	2008.65	
Ferramol mot snegler	Jern(III)fosfat: 9,9 g/kg		Skadedyrmiddel	2017.16	
Fibro	Paraffinolje (C18-30 og C17-31): 797 g/L	Y	Skadedyrmiddel	2017.21	
Killer Snegledreper'n	Jern(III)fosfat: 10 g/kg		Skadedyrmiddel	2008.60	
Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus	Pyretriner: 4,59 g/l Rapsolje: 825,3 g/l		Skadedyrmiddel	2009.71.14	
Konsentrat mot spinnmidd og lus	Fettsyrer kaliumsalter: 515 g/l		Skadedyrmiddel	2004.12	
Mycostop	Streptomyces griseoviridis: 330 g/kg	Y	Soppmiddel	2008.103	
Natria insektkonsentrat	Pyretriner: 4,59 g/l		Skadedyrmiddel	2012.12.17	
Natria insektspray	Pyretriner: 0,045 g/l		Skadedyrmiddel	2012.13.17	
NEO 1181 M	Jern(III)fosfat: 29,7 g/kg	Y	Skadedyrmiddel	2017.12	
Nordox 75 WG	kobber(I)oksid: 862 g/kg	Y	Soppmiddel	2008.43.16	

Av vanleg plantevern i øko er: Nordox (Cu), Thiovit (S), bakepulver, Fibro, rapsolje og såpe.



Preparater som kan tillates ...

PreFeRal WG	Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg	Y	Skadedyrmiddel	2010.6	
Proff Skadeinsekter	Pyretriner: 4,59 g/l Rapsolje: 825,3 g/l	Y	Skadedyrmiddel	2012.21	
Raptol	Rapsolje: 825,3 g/L Pyretrumekstrakt (50 % pyretriner): 9,17 g/L	Y	Skadedyrmiddel	2017.20	
Rotstop WP	Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg	Y	Soppmiddel	2008.54	
Serenade ASO	Bacillus subtilis QST 713: 13,96 g/l	Y	Soppmiddel	2017.14	
Sluxx HP	Jern(III)fosfat: 30 g/kg	Y	Skadedyrmiddel	2010.27.14	
Sluxx HP	Jern(III)fosfat: 30 g/kg	Y	Skadedyrmiddel	2017.11	
Sluxx HP	Jern(III)fosfat: 30 g/kg	Y	Skadedyrmiddel	2010.18.14	
Sluxx HP	Jern(III)fosfat: 30 g/kg	Y	Skadedyrmiddel	2010.25.14	
SmartBayt Profesjonell	Jern(III)fosfat: 16,3 g/kg	Y	Skadedyrmiddel	2008.73.14	
Snegledreper	Jern(III)fosfat: 10 g/kg		Skadedyrmiddel	2008.64	
Spray mot skadeinsekter og bladlus	Pyretriner: 0,045 g/l Rapsolje: 8,25 g/l		Skadedyrmiddel	2009.69.14	
Thiovit Jet	svovel: 800 g/kg	Y	Soppmiddel	2007.30	
Trinol Snegledreper	Jern(III)fosfat: 10 g/kg		Skadedyrmiddel	2017.19	

Tilsvarande finn ein for gjødselmiddel (vedlegg 1 hjå Debio) og for nytteorganismar og basisstoff hjå Mattilsynet

BASISSTOFFER ER STOFFER SOM KAN BRUKES TIL PLANTEVERN, MEN SOM HOVEDSAKELIG HAR ANDRE BRUKSOMRÅDER.


ET EKSEMPEL PÅ DETTE ER EDDIK (< 10 % EDDIKSYRE I VANN), SOM DU FINNER I DAGLIGVAREBUTIKKER FØRST OG FREMST TIL BRUK I MATLAGING. MEN EDDIK KAN OGSÅ VÆRE NYTTIG TIL BRUK SOM SOPP- OG BAKTERIEDREPENDE MIDDEL.

REGELVERKET PÅ PLANTEVERNMIDLER TILRETTELEGGES SLIK AT MAN HAR LOV TIL Å BRUKE EDDIK SOM ET BASISSTOFF TIL PLANTEVERN BÅDE I YRKESSAMMENHENG OG TIL PRIVAT BRUK.

Alt heng
saman med
alt. Det gjeld
også for
gjødsling.

Rett mengde
til rett tid og
nok tilførsel
for å dekk
opp det som
vert teke
vekk med
avling.

Dei ulike
næringsstoff
a opptrer litt
ulikt ved ulik
pH.



Kalking blir difor viktig!!!

Kalk kan vera finmalen eller grov, også levert som skjelsand. Dolomittkalk inneheld Mg.

Dei fleste kalkslag er godkjent av DEBIO.

Ein kan kalka om høsten (best) eller på våren.

Kjøpt i bulk, storsekk eller småsekker.




For sterk kalking (pH høgare enn 6,3) kan gi mangelsjukdomar pga hemming av opptak av mangan (Mn) og sink (Zn) i plantene.

Det er difor lurt å kalke regelmessig med mindre mengder om gongen!



Det held ikkje lenger med berre organisk gjødsel (møkk) og/eller fullgjødsel. Også gjødselevatning for presisjons gjødsling.



Gjødseleffekt av gras kjem ofte seinare enn ønska (topp her ca. slutten av juli/beg. av aug.)

Bladgjødning etter høsting i Kjernefrukt har dobbel effekt.. (NB! Urea (N) ikke tillatt i øko)

Behandlingstids-punkt	Handelspreparat	Mengde pr daa	Merknad	Innhald (%)
Etter høsting	Urea + Magnesiumsulfat (Bittersalt) + Solubor/Bortrac + Nordox 75 WG	1500g + 1000g +100g/ml+50 g	Bladkvalitet + styrker knoppene Vurder frukttrekraft	46 % N + 10 %Mg, 13 %S 17,5% B/10,9% B + 86 % CuO
Ei veke seinare	Urea +Zintrac + Nordox 75 WG	1500 g +100 ml + 50 g	Bladkvalitet + styrker knoppene Vurder frukttrekraft	46 % N + 40 % Zn + 86 % CuO
Ved begynnande bladgulning	Urea	3000 g	Reduserer smittepress av skurv. Vurder behov for førebygging av frukttrekraft.	46 % N

Bladgjødning – økologisk eple, pære og plomme 2020

Dersom påvist mangel (t.d. gjennom analyseresultat av bladprøve) eller trong for mikronæringsstoff ut i frå symptom på bladverk, kan det bladgjødning last også i økologisk drift. Kontakt rådgjevar for uttale.

Det er då tillatt å bladgjødning med preparat som inneheld bor, mangan, sink og magnesium, så lenge stoffa er i rein form. Ein kan då bruke same preparat, dosar og blandingar som i integrert dyrking. **Merk at Urea og ferdig blanda gjødselprodukt (t.d. Croplift, Wuxal microplant) ikkje er tillatt i økologisk drift.** Nordox og Thiovit vil også gje gjødslingseffekt av kopar og svovel.

Vegsalt + Aminosol **PS** (plantebasert Aminosol som er tillatt på spiselege vekstar) er tillatt også i økologisk dyrking for kalsiumtilførsel til sortar som treng dette. (Vegsalt/Aminosol må ikkje brukast på pære !)

Rett tidspunkt for bruk av bladgjødningspreparata er som skissert på side 24 og 33.

I **stein frukt** er viktig med fleire gonger Nordox etter at bladgulning tek til, mot bakteriekreft og haglskotsjuke.

Frå ca. midten av september til ut oktober.

1-3 sprøytingar med opp til 100 g/daa Nordox WG (obs! maks 400 g/daa og år)

Ved behov er det lurt å samtidig blande inn:


Bortrac 100 ml
Kalium Plus 150 ml
Zintrac 100 ml
(alt per daa)



Bakteriekreft infiserer gjennom sår (t.d gjennom bladarret)!




Avling NIBIO Ullensvang-felt, planta 2008:



**Koparsprøyting mot
plommepung, verkar på meir enn
berre pungen** (Resultat frå
Jorunn Børve, NIBIO Ullensvang)



Rotskjering for vekstkontroll; manuelt eller maskinelt.




**Norsk
Landbruksrådgiving**

Det konvensjonelle har mykje å læra av det økologiske og motsett



Insekt

Toprikket marihøne
Syvprикket marihøne
Gulløye
Blomsterfluer
Nebbteger






Store bruk er t.d. flinke med kjøling (rutiner), logistikk og godt utstyr. Små produksjonar/volum kostar.

Kvalitetskrav til produsenten

- Produsenten skal kjenna til offentleg regelverk som t.d. KSL
- Krav til lagring og oppbevaring av plantevernmiddel og gjødsel
- Krav til autorisasjon for bruk av plantevern og testing av sprøyteutstyr
- Gjermål skal dokumenterast; dato/notat for gjødsling, plantevern m.v. (gjødselplan, sprøytejournal)
- Krav til vatningsvatn (spredarvatning)
- Emballasjen skal vera rein/ny og stetta krav til emballering av næringsmiddel + korrekt merking av vare
- Plukking skal gjerast av folk som har fått tilstrekkeleg opplæring (NB! Hygiene)



Norsk Landbruksrådgiving x +

← → ↻ nlr.no

Apper Norsk Landbruksrådgiving

 **Norsk Landbruksrådgiving**

NYHETSARKIV FAGARTIKLER OM OSS HER ER VI RÅDGIVING ANSATTE JOBB MENTORORDNINGA I LANDBRUKET



– Ei helt suveræn ordning!

Hjalmar Rogne plantet i vår 1000 epletrær på gården i Biri. Gjennom Mentorordninga i landbruket har han fått verdifull hjelp i starten av en erfaren fruktdyrker, Knut Braastad. (Foto: Morten Berntsen Livenengen)


● ○ ○ ○ ○ ○

NLR er ein medlemsbasert organisasjon der ein som medlem har ulike rettigheter og goder; jfr. meny «Rådgiving». NLR har også ei mentorordning der ein ny produsent kan bli knytt opp mot ein erfaren dyrkar for hjelp og støtte.



Andels hagebruk,
Reko, torgsal,
gardsbutikkar,
Bondens marked,
abonnementsal,
daglegvare.
I tillegg kan
produkt foredlast.





Takk for merksemda. Lyst å bli med på laget...?!

Ta gjerne kontakt med oss i NLR:



Gaute Myren

Lier

Rådgiver frukt

905 07 087

gaute.myren@nlr.no

[Adresse >](#)



Marianne Bøthun

Leikanger

Rådgjevar frukt/øko - permisjon

952 90 740

marianne.bothun@nlr.no

[Adresse >](#)

