

Tabell 1. Tabell som viser aktuelle grønnförvekster, samt dyrkningsråd for disse
 +++ = meget god, ++ = god, + = mindre god, ÷ = lite egnet

| Art/blanding | Förreddik | Förraps | Grønnførnepe | Raigras | Havre el. bygg | Korn + raigras | Korn + förraps | Korn + ert |
|--|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|---|
| Gjødselbehov, kg N pr. dekar | 9-12 | 12-17 | 15-20 | 15-20 (2 sl.) 20-25 (3-4 sl.) | 9-14 | 14-18 (2 sl.) 18-23 (3 sl.) | 12-16 | 6-11 |
| Såmengde, Breisådd kg/daa Radsådd | 2,5-3,0 2,0 | 1,5-1,8 1,0-1,2 | 0,2-0,3 | 5 (tetraploid) 4 (tetraploid) | 22-24 18-20 | 15-18 + 4 12-16 + 3 | 8-10+1,0 6-10+0,8-1,0 | 15-18 +10-12 12-16 + 8-10 |
| Såtid | E. høstetidspkt. | Middels tidlig | Middels tidlig | Tidligst mulig | E. høstetidsp. | Tidlig | Middels-seint | Etter høstetidsp. |
| Vekstdøgn: Tidlig høsting/1.sl. Utvokst | 40-60 | 60-70 100-130 | 50-70 (blad) 80-90 (sams) 120-140 | 50-70 80-110 110-160 | 50-70 (skyting) 70-90 (deigm.) 90-110 (gulm.) | 50-80 (bland.) 80-120 (raigr.) 110-160 (raigr.) | 70-90 90-110 | 70-90 90-110 |
| Antall høstinger ved tidlig såing | 1 (2) | 1 (2) | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 1 | 1 (2) |
| Avling, FEm/daa | Tidlig høsting/1 sl Utvokst/total avling Gjenvekst e tidlig h. | 250-350 | 300-350 400-600 0-200 | 300-350 (blad) 600-750 350-450 (sams) | 200-300 450-600 200-400 | 250-350 350-500 -150 | 250-350 450-600 150-250 | 350-400 450-600 250-350 350-500 -150 |
| Förverdi FEm/kg ts | Ferskt för Utvokst | 75 | 80 (h.e. 2-3 md.) | 91 (bl.), 109 (roe) 74 (sams) | 94 (it), 82 (ww) | 65-80 | 70-85 (sams) | 68-85 |
| Tørrstoffinh., %: | Tidlig høsting Utvokst | 10 | 8-10 12-15 | 8-10 (blad) 10-11 (sams) | 10-14 14-17 | 14-17 17-22 | 12-15 (sams) 15-18 (sams) | 11-14 18-23 |
| Eks. på aktuelle sorter | Siletta Nova | Kentan Nova, Solan, Barcoli, Emerald | Marco, Barkant, Kvit Mai | Westerwolsk: Lemos, Billiken Italiensk: Meroa, Mondora, Macho, Ajax | Havre: Olram, Kapp, Biri. Bygg: Arve, Thule, Lise, Olsok | Ital. raigras | | Ert: Poneka, Odin, Carneval, Bohatyr |
| Konkurranseevne mot ugras | +++ | +++ | ++ | ++ (+++ gjenv.) | ++ | ++ (+++ gjenv.) | ++ | + (+) |
| Kjemiske ugrasmidler | Frøugras Kveke m.fl. gras Balderbrå (korgpl.) | Ramrod Nabu-S, Focus Ultra Matrigon | Som förreddik Som förreddik | Som förreddik Som förreddik | Som i græsgjen- legg, mange aktuelle midler | Som vårkorn, mange midler | Som græsgjen- legg | Roundup mot spirt ugras før kulturen spirer |
| Bruksmåte | Beiting Direktesføring Ensiling direkte Ens. e. fortøking | ++ ++ - ++ | +++ +++ + +++ | +++ ++ + (it), ++ (ww) +++ | +++ (tidlig) +++ ++ (+) ++ (+) | ++ +++ ++ ++ (+) | +++ +++ +++ ++ (+) | +++ +++ +++ ++ (+) |