

Høstetidsprognoser
2026
Glåmdalen



Høstetidsprognoser 2026

Innhold

Magnor	3
Kongsvinger	5

Magnor



Bilde 2: 1. juni, 2 - 3 leddknuter


Om lokasjonen:

- Hos Tom Lindalen
- Timoteiblandet 1.års eng, konvensjonell, 160 moh. Sør-øst vendt eng som ligger oppe i skogen sør-vest for Magnor sentrum
- Jord; Stagnosol med siltig lettleire
- Døgngrader; 169, basert på nærmeste værstasjon Roverud (38 km avstand)


Notater fra uke 23

2-3 leddknuter, 70 cm høyt. Tett, frodig eng med god busking.


FEm nedgang



Råprotein nedgang



Grovfôrmodellen



Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 0,80 FEm/kg TS den 15.juni.

Kongsvinger

Om lokasjonen:

- Hos Ole Aksel Grønnerud
- Timoteiblandet 2.års eng, konvensjonell, 162 moh. Sør-vendt eng som ligger i lia ned mot Glomma
- Jord; Cambisol med sandig silt
- Døgngader; 169, basert på nærmeste værstasjon Roverud (10km avstand)




Bilde fra 1.juni, 3 leddknuter


Notater fra uke 23

3 leddknuter, 80 cm høyt. Begynnende skyting. Tett, frodig eng med god busking.


Fem nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Med utgangspunkt for værstasjonen på Roverud anslår grovfôrmodellen en energinedgang til 0,80 FEm/kg TS den 15.juni.

Link til grovfôrmodellen: [Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)