

Høstetidsprognoser 2026

Gudbrandsdalen



Høstetidsprognoser 2026

Innhold

Gausdal	3
Varmesum Gausdal.....	4
Vågå	5
Lom	7
Varmesum Leirflaten	9
Fåvang	10
Vinstra	11

Gausdal


Om lokasjonen:

- Vert: Jostein Øistad Jacobsen
- Konvensjonell, 2.års eng
- Strandsvingel, timotei og kløver

FEm nedgang




Råprotein nedgang



Grovfôrmodellen viser en forventet nedgang i energi til 0,97 FEm pr kg TS den 4.juni.

Varmesum Gausdal



Vågå

Om lokasjonen:

- Ole Jakob Holen, Uleberg
- Konvensjonell, 2. engår 359 moh
- Timotei, kløver og bladfaks
- Vekststart ca. 19. april, døgngader pr 26. Mai; 320 grader (utfra målestasjon på Fåvang)



Bildet tatt 26. Mai

Notater fra uke 22


1 leddknote på timoteien, 33 cm i middel og 3 blad. Jordtemperatur; 9,8 grader. Tett og fin eng med mye innslag av kløver. Enga har buska seg fint, ettersom vi har hatt en kjølig vår.

FEm nedgang



Råprotein nedgang





Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 0,99 FEm/kg TS den 5.juni.

Lom

Om lokasjonen

- Simen Storkjørren, Lom
- Timotei, bladfaks, kløver
- Konvensjonell, 2. engår, ca. 420 moh
- Vekststart 20. April
- Døgngrader pr 26. Mai; 219 grader (målt ut fra værstasjon på Løken)



Bildet tatt 26. Mai

Notater fra uke 22

Ingen leddknute, to blad og 26 cm i middel. Jordtemperatur; 8 grader. Enga framstår som tett og i god stand. Veksten har tatt seg betraktelig opp flere steder de siste dagene, noe som trolig skyldes kombinasjonen av litt nedbør og økte temperaturer. Dette har gitt bedre vekstforhold og bidratt til en mer jevn utvikling i enga.

FEm nedgang




Råprotein nedgang





Grovfôrmodellen
anslår en
energinedgang til
0,99 FEm/kg TS
den 5.juni.

Varmesum Leirflaten



Fåvang

Om lokasjonen:

- Per Einar Brandstad, Vollen nord for Fåvang
- Timotei, strandsvingel, kløver
- konvensjonell, 3. engår og 182 moh.
- Vekststart: 19.april
- Døgngrader: 320 per 26.mai, hentet ut fra værstasjon på Fåvang



Notater fra uke 22

Bilde 1: 26.mai, 1 leddknote


1 leddknote 2-3 cm over bakken, enga er 35 cm høy i gjennomsnitt. Generelt fint vær med høye temperaturer med noe nedbør den siste uken, målt opp mot 20 mm ved værstasjonen på Fåvang. Jevn og fin vekst i enga, med god busking og uten tegn til sykdomsangrep.

FEm nedgang



Råprotein nedgang





Grovformodellen anslår en energinedgang til 0,91 FEm/kg TS den 9.juni.

Vinstra

Om lokasjonen:

- Amund A Lo
- Timotei, kløver
- konvensjonell, 2. engår og 278 moh.
- Vekststart, 19.april
- Døgngader: 320 per 26.mai, hentet ut fra værstasjon på Fåvang



Bilde 2: 26.mai, 1 leddknote

Notater fra uke 22

1 leddknote 2-3 cm over bakken, enga er 35 cm høy i gjennomsnitt. Generelt fint vær med høye temperaturer, med noe nedbør forrige uke. Tett og jevn eng med god busking, og ingen tegn til sykdomsangrep. Værprognosene framover spår en del nedbør og høye temperaturer, som vil gjøre godt for veksten.

FEm nedgang



Råprotein nedgang



Grovformodellen anslår en energinedgang til 0,86 FEm/kg TS den 9.juni.