

Høstetidsprognoser 2026

Gudbrandsdalen



Høstetidsprognoser 2026

Innhold

Gausdal	3
Varmesum Gausdal.....	4
Vågå	5
Lom	6
Heidal	8
Varmesum Leirflaten	9
Lesja	10
Fåvang	12
Vinstra	13

Gausdal


Om lokasjonen:

- Vert: Jostein Øistad Jacobsen
- Konvensjonell, 2.års eng
- Strandsvingel, timotei og kløver


Notater fra uke 25

Fjerde og årets siste klipping 15.juni. Timoteien står i fullskyting og enga skal slås.


FEm nedgang



Råprotein nedgang



Varmesum Gausdal



Vågå

Om lokasjonen:

- Ole Jakob Holen, Uleberg
- Konvensjonell, 2. engår 359 moh
- Timotei, kløver og bladfaks
- Vekststart ca. 19. april, varmesum pr 15. juni; 577 grader




Bilde tatt 15. juni


Notater fra uke 25

15. Juni målte vi timoteien til ca. 90 cm, 4 leddknuter og 5 blad. Timoteien er i skyting. Siste prognoseuttak 15. Juni.

FEm nedgang



Råprotein nedgang



Lom

Om lokasjonen

- Simen Storkjørren, Lom
- Timotei, bladfaks, kløver
- Konvensjonell, 2. engår, ca. 420 moh
- Vekststart 20. April
- Varmesum pr 17. Juni; 525 grader, målt ut fra EasyGrowth målestasjon vi har stående der.




Bildet tatt 1. Juni


Notater fra uke 25

Timoteien er nå i middel 70 cm høy og i skyting. Vi ser 3 leddknote, 4-5 blad. Ingen tegn til sykdomsangrep. Avventer resultater fra uke 25.

FEm nedgang



Råprotein nedgang





Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 0,87 FEm/kg TS den 19.juni.

Heidal

Om lokasjonen


- Terje Jonny Sveen, Leirflaten
- Timotei, engsvingel og kløver
- Konvensjonell, 2. engår og 600 moh
- Vekststart: 3. mai
- Varmesum pr 15. Juni: 416 grader




Notater fra uke 25

Enga er i snitt 55 cm høy. 2 leddknote og 4 blad. Ser litt angrep av timotei- øyeflekk. Regn og vind de siste dagene, har gjort at mye av graset har lagt seg. Siste prognoseuttak 15. juni. Slått 16. juni


FEm nedgang



Råprotein nedgang



Varmesum Leirflaten



Lesja

Om lokasjonen:


- Kim Berget, Lesja Prestegard
- Bladfaks
- Konvensjonell, 14. engår og 600 moh.
- Vekststart: 4. mai
- Varmesum pr 8. juni: 314 grader
hentet ut fra værstasjon på Fåvang




Notater fra uke 25

I gjennomsnitt er enga fortsatt 60 cm høyt. Enga er tett, men veksten har stagnert. Det har også kommet en del nedbør uken som var. Vi håper på godt slåttevær fremover. Jordtemperatur mandagsmorgen 15. juni var 7 grader. Ingen tegn til sykdom. Avventer resultater fra uke 25.

FEm nedgang



Råprotein nedgang





Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 0,86 FEm/kg TS den 19.juni.

Fåvang



Om lokasjonen:

- Per Einar Brandstad, Vollen nord for Fåvang
- Timotei, strandsvingel, kløver
- Konvensjonell, 3. engår og 182 moh
- Vekststart: 19.april
- Varmesum: 550 per 11.juni,
hentet ut fra værstasjon på Fåvang



Notater fra uke 25

Enga er i gjennomsnitt 70 cm høy. Timotei er i full skyting, med 3 leddknuter og 5-6 blad. Fortsatt fin og jevn eng, uten tegn til sykdom. Har også vært gode temperaturer denne uken, men en del regn og vind som har gjort at enga delvis har lagt seg flere steder.



Vinstra

Om lokasjonen:

- Amund A Lo
- Timotei, kløver
- konvensjonell, 2. engår og 278 moh.
- Vekststart, 19.april
- Varmesum: 550 per 11.juni, hentet ut fra værstasjon på Fåvang

Notater fra uke 23 og 24

I gjennomsnitt er enga 40-45 cm høy, hvor 1. leddknote er 5-7 cm over bakken. Har også vært fint vær denne uken, og vi håper på at det kommer litt regn fremover, slik det er spådd. Enga er tett og fin, vokser jevnt. Enga ble slått 07.06.

