

Høstetidsprognoser

2026

Jæren og Dalane



Innholdsfortegnelse

- Arnstein Røyneberg, Sola. Raigas – 2. års eng
- Arnstein Røyneberg, Sola. Timotei – 1. år eng
- Odd Grødem, Bryne. Raigras
- Ivar Eldor Espeland, Bjerkreim. Timotei 60 m.o.h.
- Torbjørn Espeland, Bjerkreim. Timotei 200 m.o.h.

Sola

Om lokasjonen:

- Arnstein Røyneberg. Raigras.
- Vekststart 8. mars.
- Døgngrader: 618 (2. juni)




Bilde 1: Dato, X leddknuter


Notater fra uke 23

Feltet slått 27. mai


FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Sola

Om lokasjonen:


- Arnstein Røyneberg. Timotei
- Vekststart 8. mars.
- Døgngader: 618 (2. juni)




Bilde 1: Dato, X leddknuter

Notater fra uke 26


FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Bryne

Om lokasjonen:

- Odd Grødem. Raigras.
- Vekststart 8. mars (Særheim).
- Døgngader: 618 (2. juni)




Bilde 1: Dato, X leddknuter


Notater fra uke 23

Feltet hausta


FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Bjerkreim

Om lokasjonen:

- Ivar Eldor Espeland. 2. års eng, timoteidominert. 60 m.o.h..
- Vekststart 8. mars (Særheim).
- Døgngader: 618 (2. juni)




Bilde 1: Dato, X leddknuter


Notater fra uke 26

Feltet er hausta


FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Bjerkreim

Om lokasjonen:

- Torbjørn Espeland. 3. års eng, timoteidominert. 200 m.o.h..
- Vekststart 8. mars (Særheim).
- Døgngrader: 618 (2. juni)




Bilde 1: Dato, X leddknuter

Notater fra uke 26

Feltet er hausta


FEm nedgang

Bjerkreim - 200 m.o.h., FEM/kg ts




Rå .pr g/kg ts nedgang

Bjerkreim - 200 m.o.h., Råprotein g/kg ts



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPWeb](#)

Alle verdier alle lokasjoner

	Dato	FEM/kg ts	Råprotein, g/kg ts	% Tørrstoff	NDF, g/kg ts	Sukker, g/kg ts	MSC	Høgde
Odd Grødem Raigras	18.mai	1,10	223		309		1,72	14,9
	26.mai	1,04	264		397		1,92	27,5
		Feltet hausta						
Arnstein Røyneberg Raigras	18.mai	0,99	234		432		1,63	16,7
	26.mai	0,95	264		478		1,89	23,8
		Feltet hausta						
Arnstein Røyneberg Timotei	18.mai	feil	264				1,88	23
	26.mai	feil	264				2,38	41
	02.jun	0,90	192	14,4	641	51	2,86	61
	09.jun	0,82	124	16,0	685	79	3,08	78
	16.jun	0,87	136	20,8	603	111		
	23.jun	0,75	89	25,5	653	126		
Ivar Eldor Espeland Timotei 60 m.o.h.	26.mai	feil	264		517		2,46	40
	01.jun	0,94	197	18,3	616	79	2,83	56
	08.jun	0,90	172	18,5	650	93	3,09	65
	15.jun	0,87	136	21,1	659	114		
		Feltet hausta						
Torbjørn Espeland Timotei 200 m.o.h.	26.mai	feil	264		177		2,17	35
	01.jun	0,96	163	15,6	599	118	2,66	49
	08.jun	0,90	151	14,4	645	105	3,05	65
	15.jun	0,86	106	24,1	639	151		
		Feltet hausta						

Varmesum

