

Høstingen er nå ferdig, og rydding av felt står for tur. Etter høsting fjernes de gamle skuddene og det tynnes i de nye skuddene. I økologiske felt er det best å gjøre det rett etter høsting for å få luftigere hekker.

Ved fjerning av gamle skudd er det viktig å skjære disse lengst ned mot jorda som mulig. På denne måten fjerner en mulige overvintringssteder for både sopp og insekter. Når det gjelder årets skudd; fjern små skudd og tynneste og tykkeste av nye skudd og det bør stå igjen ca. 4-6 skudd per plantehull. De tykkeste skuddene er vanligvis mer smittet med skuddsyke og gråskimmel og bør derfor fjernes. Rust er synlig i alle felt.

Ved utskjæring bør feltene sjekkes for bringebærbarkgallmygg (rødoransje larver i barken) og bringebærgallmygg (oransje larver i galler) og fjern de skuddene som har disse skadedyrene på skuddene.

Sjekk også feltene for spinnmidd og bladmidd. Det er mye bladmidd å se i enkelte felt. Her må en regne med to olje/såpe-behandlinger i slutten av oktober.

Når det gjelder sopp; Nordox har effekt mot flere soppsykdommer og bør brukes etter behov. Nordox kan brukes etter utskjæring, før regn. Bruk 100g per daa. Nordox brukes for å redusere både rust og Agrobacterium smitte. Væskeforbruk 20-35l per 100 m rad.

Vi oppfordrer alle til å ta bladprøver etter avsluttet høsting. Med prøvene fra i fjor kan en se hvilke tiltak som fungerte i år og hvordan næringsforsyningen er i feltet.

Minner om behov for vanning i feltene nå siden det har ikke vært mye nedbør av betydning i det siste.