

Sideskuddene er fra 3 - 10 cm lange på friland og det er stor forskjell i utviklingen fra sted til sted. Det er god spredning i utvikling, men også en del ujevn bryting i feltene. På tidligste steder ser vi antydning til blomsteranlegg og blomstring kan forventes om par uker.

Tynning

Det er en del felt som har kommet langt og nye skudd fra bakken er ca. 10 cm. Her kan en starte med tynning arbeid. La det stå ca. 6 -8 skudd per plantehull. Når skudd er unge, kan de fjernes med fingrene og denne jobben kan gjøres raskere. En fjerner skudd som kommer fra kanten av plantehullet hvis nok skudd. Det er også aktuelt å fjerne de tykkeste skudd siden de kan vokse seg for tykke. Slike tykke skudd er mest utsatt for sykdommer senere i utviklingen og vi ser i år at slike skudd bryter dårlig og har hatt mer frostskafer. Å tynne planter tidlig er viktig i økologisk produksjon for å unngå for tette hekker ned ved basis av plante. Tette hekk kan føre til oppblomstring av gråskimmel og rust.

Gjødsling

Alle har startet med gjødselvanning. Det er to type gjødsel som kan brukes i denne perioden i gjødselvanning Pioneer Complete og Biorg N. Husk 20 % gjødsel og 80 % vann i gjødseltanken. For mengde og tidspunkt se egen gjødselplan. En bør gi gjødsel en gang per uka.

Bladgjødsling

Nå er det tiden å se på bladprøver som ble tatt i fjor. Sjekk hvilken elementer som ble mangel på. Hos de fleste er det mangel på bor og magnesium. Aktuelt preparater ved bor mangel er (Solubor, Lebosol Bor og Folio B) 100ml/g daa og for magnesium er Lebosol Magnesium 400 SC (300-500 ml/daa) Bladgjødsling er mest effektiv måte å tilføre nødvendige elementer.

Soppsprøyting

Neste soppsprøyting med Nordox når de nye skuddene er 20-40 cm høye kan være aktuelt. Bruk 100g/daa.

Bringebærville

Det er registrert første bringebærbillene i fellene forrige uke. Sjekk jevnlig fellen at de har nok vann (som er blandet med veldig lite såpe) siden vann kan fordampe ved høye temperaturer. Minner også om fjerning av ville bringebær rundt feltet.

Arbeidsoppgaver

Vanlig arbeidsoppgave i denne perioden er klipping av gras i feltet spesielt langs plantkanten. Dette bør gjødes regelmessig i denne perioden med en del nedbør når graset vokser fort.

Pollinering

I løpet av to -tre uker er det aktuelt å sette ut bikuber hos dem som har mulighet for det.