

En ser første blomster åpne på tidlige steder. Når det gjelder andre frilandsfelt skal en vente 7-14 dager før første blomster åpner seg. Bikuber bør være plassert ved siden av felt hvor det er mulighet for det. Bringebæravlingen blir større som følge av bedre kvalitet og bærstørrelse. Fra blomstring til modne bær går det ca. 35 dager, noe som er avhengig av værforholdene.

Arbeidsoppgaver

Det er aktuelt å tynne nye skudd. Det bør stå igjen mellom 4-6 skudd per plantehull. Dette er et viktig tiltak for å redusere smittepress for gråskimmel og rust.

Vanlig arbeidsoppgave i denne perioden er klipping av gras i feltet spesielt langs plantkanten. Dette bør gjøres regelmessig. Ved begynnelse av blomstring skal en sette ut plastråden i ytre posisjon.

Bringebærbille

Ved starten av blomstring kan en trekke inn bringebærbillefeller inn i feltet. Men fra erfaringen vet vi at disse fellene fanger lite bringebærbiller når det er nok blomster. Det er aktuelt å notere hvilke feller som har fanget mest av biller og notere fra hvilken retning billene kommer fra. Denne informasjon brukes til neste år så at en kan sette mange nok feller i den retning som er mest utsatt for bringebærbille. I år fanges mye bringebærbille.

Gjødsling

I gjødselvanning bør en følge sine ukentlige gjødselplan med gjødsel tilførsel en gang per uke. Foreløpig er det nok fuktighet i jorda under mypex og ikke nødvendig å kjøre noe ekstra vanning i uka på tyngre jordarter. Felt som er etablert på lett sandjord bør sjekke behov for vanning. Foreløpig er det nok å vanne en gang i uken i forbindelse med å gi flytende gjødsel, men dette kan fort forandres siden det er meldt høye temperaturer i de neste 10 dager.

Bladgjødsling

I felt hvor det er påvist næringsmangel er det aktuelt å bladgjødse feltene. Ifølge det økologiske regelverket er det nødvendig å påvise behov for bruk av enkelte gjødselslag. For dem som har tatt bladprøver i fjor kan dette brukes som dokumentasjon. I felt hvor bladprøver i fjor har påvist K-mangel er det aktuelt å bruke ca. 15-20 kg Patentkali (Kalimagnesia) i kartdanningen, dvs. om to til tre uker. Den inneholder både K og Mg. Kan kjøpes i 25 kg/sekk.

Hos de fleste er det mangel på bor og magnesium. Aktuelt preparater ved bor mangel er (Solubor, Lebosol Bor og Folio B) 100ml/g daa og for magnesium er Lebosol Magnesium 400 SC (300-500 ml/daa) Bladgjødsling er mest effektiv måte å tilføre nødvendige elementer.