

Blomstringen er godt i gang og god del kart er synlig på tidlige steder. Det er fortsatt aktuelt å tynne nye skudd. Det bør stå igjen mellom 4-6 skudd per plantehullet. Minner igjen at dette er viktig tiltak for å redusere smittepress for gråskimmel og rust. I denne perioden en kan vurdere angrep av bladmidd og se eventuelle tegn på næringsmangel.

Vanlige arbeidsoppgave er klipping av gras i feltet spesielt langs plantkanten. Dette bør gjøres regelmessig. Husk å flytte tråden til ytre posisjon. Fra blomstring til modne bær går det ca. 35 dager, noe som er avhengig av værforholdene.

Gjødsling og bladgjødsling

I gjødselvanning en bør følge sine ukentlige gjødselplan. En bør gi gjødsel en gang per uka på dagene uten nedbør. I denne perioden når karten er synlig en bør bytte til enten Pioneer K Max eller Biorg K av flytendegjødsel hos dem som har dryppvanning.

I felt hvor det er påvist næringsmangel er det aktuelt å bladgjødse feltene. Ifølge det økologiske regelverket er det nødvendig å påvise behov for bruk av enkelte gjødselslag. For dem som har tatt bladprøver i fjor kan dette brukes som dokumentasjon. I felt hvor bladprøver i fjor har påvist K-mangel er det aktuelt å bruke ca. 15-20 kg Patentkali (Kalimagnesia) i kartdanningen, dvs. om to til tre uker. Den inneholder både K og Mg. Kan kjøpes i 25 kg/sekk.

Hvis det er påvist mangel på bor og magnesium, er aktuelt med følgende: ved bor mangel er (Solubor, Lebosol Bor og Folio B) 100ml/g daa og for magnesium er Lebosol Magnesium 400 SC (300-500 ml/daa) Bladgjødsling er mest effektiv måte å tilføre nødvendige elementer.

Vanning

På friland behovet ligger rundt 6-9 mm/dag i denne perioden (erfaringer fra 2018) og enda høyere i tunnel. Ved overvanning bruk ca. 10-12 mm hver andre dag. Plantene må tørke opp etter vanning. Ved dryppvanning er viktig å vite slangekapasitet dvs. hvor mye vann den gir per meter rad. f eks. dryppslange med 50 cm avstand mellom dryppene som gir 4,4 l/m/time bør stå ca. 1,30min per dag for å gi 6,6 l/time). Hvis behovet er større, er det nødvendig å dele vanning i to omganger. Husk at hos nyplantede felt vannbehov er mye mindre.

Arbeidskraft

De fleste som dyrker økologiske bær, selger sine bær på selvplukk og her er viktig å ha gode rutiner. For dem som leier innhøstingshjelp minstelønnen for ferie- og innhøstingshjelp gjelder satser fra 1. juli 2021. Mer informasjon en kan finne på www.arbeidstilsynet.no

Som gjennomsnittlig plukker en ca. 6-8 kg bringebær per time.