

Høstarbeid i ribes-felt

Etter høsting er det aktuelt å rydde opp i feltene med grasklipping og ugrasluking. Skjær også bort tørre greiner og nedliggende greiner (industrifelt).

I felt for maskinhøsting eller enkeltbusksystem som har produsert i flere år og nå har fått en del tørre og dårlige greiner, må en i høst vurdere å skjære ned hele busken til basis, dvs. 5-10 cm over bakken, slik at en kan fornye greinmassen neste år. Imidlertid bør ikke slik fornying skje før all vekst er avsluttet og normalt bør ikke dette skje før tidligst i siste halvdel av oktober i lavlandet. Vær oppmerksom på at slik nedskjæring vil føre til et større ugraspress fra tidlig vår og at en må forberede seg på en hyppig ugraskamp mens nye greiner vokser frem.



På bildet til venstre er det skåret ned ei tettplanting av solbær høsten før og tidlig i mai er det knapt gjenvekst av nye skudd. På bilde til høyre er det midt i juli kommet godt med nyvekst av skudd og det er brukt et mekanisk utstyr for ugrasbekjempelse langs raden.

Espalierfelt

Etter høsting fjernes sidegreiner som har gitt bær, forutsatt at det er nok vekst av nye sidegreiner. Hvis det er få nye greiner, kan 1-2 sidegreiner pr plante/ hovedgrein beholdes et år til. Ripsplanter som har nådd full høyde kan ha ca 4 sidegreiner pr hovedgrein, eller 10-12 sidegreiner pr plante. Sidegreinene skjæres med en tapp på 0,5 cm, (ripssorten J. van Tets 1,5 cm tapp). Utvokste stikkelsbærplanter (ca 1,3-1,5 meter høyde) som har ei hovedgrein pr plante, kan ha maks 10-12 sidegreiner pr plante. Antallet avhenger av plantas vekstkraft. Behold sidegreinene hos solbær fram til våren på grunn av fare for vinterskade og tørre greiner.

Hvis det har kommet mange nye greiner fra basis, må disse skjæres bort. Dersom noen av hovedgreinene dør ut, må nye greiner ledes opp.

I stikkelsbær er enkelte av sortene litt svake i overvintringen slik at en bør beholde flere greiner fram til ny beskjæring til våren i tillegg må en ikke toppe toppskuddet nå men vurdere topping til våren når en ser hvordan overvintringen har vært.



Yngre Mucurinesplante som har hatt god vekst i år og gitt litt avling. Bildet er tatt seint i august og her blir alle greiner helt nederst mot basis fjernet i høst og en vurderer antallet sidegreiner som kan være med gjennom vinteren før eventuell ny beskjæring til våren. Husk at toppskuddet må bindes fast for å unngå brekkasje. Mucurines har vist god overvintringsevne og har hatt lite utfrysing om vinteren i Innlandet.