

Utvikling

Bilde: høyre -solbær, Ben Tron fra 4. mai i Ringsaker.

Under – stikkelsbærsorten Mucurines 28. april.

Foto: Jørn Haslestad

På Østlandet har det vært kjølig vær de siste 2 ukene. Utviklingen har gått sakte framover. Men vi er omtrent som fjoråret. Tidlige solbærsorter, som for eksempel Ben Tron har Innlandet fått synlig bladvekst, men blomsterknopper/drueklase er ikke synlig enda (stadium C3). Rundt Oslofjorden er blomsterstand/ drueklase nå fremme i Ben Tron. Rips har fortsatt tett klase eller begynnende strekking av klasen. Stikkelsbær har frie blomsterknopper. Ellers varierer utviklingen mye med sort og sted.

Flere



steder på Østlandet rapporteres det om overvintringsskader i solbær, antagelig som følge av tele i jorda og en periode med høye temperaturer rundt påske som har gitt for tidlig bryting og påfølgende skade av manglende vannopptak gjennom røttene. Omfanget er ikke kartlagt enda.

Det er tørt mange steder på Østlandet, så en må vurdere om det er vanningsbehov kommende uke, spesielt på lette jordarter. Det har vært nattefrost mange netter, men forhåpentligvis har blomsterknoppene kommet så kort i utvikling at de ikke har tatt skade og vi har kun notert et par kuldegrader i bærdistriktene i Innlandet.

Arbeid i felt

I tiden framover bør flerårig ugras lukes bort så snart det kommer i vekst, og mens det enda er smått. I espaliersystem må skade på stolper og støttesystem rettes opp. Nyplantinger må støttes opp. Antall hovedgreiner, 1 – 3 pr plante, korrigeres for felt som ble etablert i fjor, dersom det ikke allerede er gjort. Pass på at hovedstammene blir festet til bambus slik at de vokser så rett oppover som mulig. Spesielt viktig er det å støtte opp toppen av stikkelsbærplantene. Toppene vil gjerne bøye seg utover. Det fører til at sidegreiner lett tar overhånd. Fjern også fjorårsvekst ved basis (nye skudd som har vokst fram og vil konkurrere med hovedstammen). Graset mellom radene klippes etter hvert som det vokser til.

Plantevern

Se også forrige melding om forebyggende soppsprøyting med enten Nordox (kobber) eller Thiovit (svovel). Bladfall- og bladflekkssopp: Bekjempelse ved blomstring må følges opp. Sprøyting med Nordox i forkant av nedbør. Avhengig av smittepress i feltet og nedbør er det aktuelt med 2-4 sprøytinger rundt blomstring med 7-10 dagers mellomrom. I henhold til etikett kan Nordox brukes etter blomstring med større væskemengde. Svake doser, 50 g pr daa, har god virkning.

Mjølddogg: I mjølddoggutsatte sorter anbefales sprøyting med 10-14 dagers mellomrom, Thiovit Jet 4-600 gram pr daa og Serenade 400-800 ml pr daa. NB! Serenade er bare godkjent i solbær, ikke i rips og stikkelsbær.

Temperaturen bør være over 12 gr ved sprøyting med Thiovit Jet. I fuktig vær er mjølddogg ikke noe problem, så sprøyting kan utsettes i områder der det er fuktig og kjølig vær. Sorter som er utsatt for mjølddogg: Solbær: Ben Nevis. Rips: Junifere, andre sorter som står nær Junifere i tillegg til sorten Haronia. Stikkelsbær: Tatjana, Xenia m.fl. Fare for sviskade av Thiovit Jet i noen sorter.

Thiovit Jet virker også mot solbærgallmidd, dersom den er observert i feltet.

Ripsskuddmøll



*Bilde til venstre:
Skuddtopper angrepet
av ripsskuddmøll.*

*Til høyre: Larve av
ripsskuddmøll i
solbærknopp. Foto
Sigrid Mogan.*

Skuddtopper angrepet av ripsskuddmøll kan observeres nå utviklingen har kommet så langt som på bildet. Skuddtopper og knopper visner inn. Larve kan observeres inne i knoppen slik som vist på bildet. Skuddtopper kan skjæres bort og brennes.

Bikuber

God pollinering er svært viktig. Humler og bier er viktige hjelpere. Humlene flyr ved lavere temperatur enn biene, men det kan være nyttig å ha bikuber i nærheten av feltene. Følg med på utviklingen av blomstene. Bikuber må være på plass ved begynnende blomstring.