

Kampen mot ugraset

Nå som nattefrosten begynner å slippe taket, vil både kulturplanter og ugras begynne å strekke på seg. Det kan være en ide å ta seg en runde i eng og på beiter for å danne seg et bilde av årets strategi mot ugraset. Vi har lånt en fin oversikt fra NLR Rogaland, over de vanligste ugrasplantene i etabler eng og beite.

tekst og foto: Annlaug Fludal, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, oppdatert mars 2021

Blad	Blomst	Namn	Rådgjerer
		Vanleg høymole Syrefamilien Fleirårig Frøspreiing og med rotbitar Frø beheld spireevne lenge i jord og husdyrgjødsel	Kjemisk: mange aktuelle middel; I etablert eng / beite: Gratil ⚙️ -7 dagar behandlingsfrist Flurostar 200 = Tomahawk 200, ⚔️, Harmony ⚙️ - 7 dagar behandlingsfrist Starane XL = Cleave -⚔️, -14 dagar behandlingsfrist mekoprop (fleire preparat-namn)⚙️ ⚔️, - 14 dagar Banvel ⚙️ ⚔️, - 21 dagar
		Byhøymole Syrefamilien Fleirårig Frøspreiing og med rotbitar. Meir forgreina rot enn vanleg høymole Frø beheld spireevne lenge i jord og husdyrgjødsel	⚔️ kan skada kløver ⚙️ kan setta graset tilbake Mekanisk: spa opp med hagespade eller spesialutstyr. Få med minst 5 cm av rotstokken. Gjenlegg med tett plantedekke, vil hemma veksten. Blir beita av sau.
		Syregras – matsyre Syrefamilien Fleirårig Spreiing med korte, underjordiske utløparar og frø	Kjemisk: fluroksypyr-preparat (Flurostar 200, Tomahawk 200, Cleave, Starane XL) Mekanisk: ingen aktuelle metodar i etablert grasmark. Surjordsplante. Kalking kan redusera bestanden. Tid for gjenlegg?
		Løvetann Korgplantefamilien Fleirårig Frøspreiing og rotbitar. Frøa misser raskt spire-evne. Dyrka som nytteplante i enkelte land.	Kjemisk: fluroksypyr-preparat (Flurostar200, Tomahawk 200, Cleave, Starane XL) Express, Gratil + MCPA, Mekanisk: ingen aktuelle i etablert grasmark. Tid for gjenlegg? Blir godt beita av sau.
		Åkertistel Korgplantefamilien Fleirårig Spreiing med undrejordiske utløparar og oppdelte rotbitar (i jord). Stort og djupt rotsystem.	Kjemisk; fenoksysyrer (mekoprop, MCPA) Gjentatt sprøyting på nyvekst Mekanisk: utarming ved gjentatt beitepussing over fleire år. Dekking med svart plast på små koloniar. Trivest best i åkerkulturar.
		Myrtistel Korgplantefamilien To-årig Frøspreiing	Kjemisk: fenoksysyrer (mekoprop, MCPA) i april-mai; før stengel-strekking eller på nye rosettar på ettersommaren. Skjerma punktsprøyting i rosetten med glyfosat. Mekanisk: Salt eller kunstgjødsel i rosetten vil tørka ut planta. Hacking av rosetten, heile året om mulig. Avpussing av blomsterstand.
		Vegtistel Korgplantefamilien To-årig Frøspreiing	

		Landøyda Korgplantefamilien Fleirårig Frøspreiing Giftig, særleg for storfe og hest. Gifta forsvinn ikkje ved ensilering / tørking	Kjemisk: Gratil eller mekoprop i starten av mai. Mekanisk: hakking eller dra opp planter for hånd.
		Revebjelle Maskeblomstfamilien To-årig Frøspreiing Svært giftig. Medisinplante.	Kjemisk: mekoprop har gitt gode resultat i forsøk. Mekanisk: handluking, hakking av rosett, dra opp blomsterplanter. Fjerna blomsterstand før frøsetting.
		Krypsoleie Soleiefamilien Fleirårig Spreiing med overjordiske utløparar og frø	Kjemisk: fenoksysyrer. MCPA er oppgitt med best verknad på etablerte planter, evt i blanding med fluroksypyr (Tomahawk 200, Flurostar, Spitfire). Trivest på moldrik, våt jord.
		Engsoleie Soleiefamilien Fleirårig Spreiing med frø Giftig. Blir ståande igjen i beite. Gifta forsvinn ved tørking eller ensilering	Kjemisk: fenoksysyrer. Mekoprop er oppgitt med best verknad på etablerte planter. Express med klebemiddel (beite)
		Vassarve Nellikfamilien Eittårig Spreiing med frø Ikkje giftig, men blir ofte vraka av dyra. Hard beiting med sau om våren kan dempa bestanden.	Kjemisk: sjeldan nødvendig i etablert grasmark. Express med klebemiddel (beite) eller mekoprop tidleg vår, Harmony med klebemiddel, Mekanisk: ingen aktuelle metodar i etablert grasmark. Likar godt gjødsla og kalka areal. Forebyggande: unngå trakkskade . Så i grasfrø på opptrakka areal.
		Stornesle = brennenesle Neslefamilien Fleirårig Spreiing med underjordiske utløparar og frø Gammal nytteplante	Kjemisk: fluroksypyr-preparat (Flurostar 200, Tomahawk 200, Cleave, Starane XL) Mekanisk: utarming ved gjentatt avpussing Trivest på godt gjødsla areal (nitrogen-elskande)
		Hundekjeks Skjermplantefamilien Fleirårig Frøspreiing	Kjemisk: Harmony med klebemiddel eller mekoprop (sterk dose) Mekanisk: Tid for gjenlegg om det er mykje hundekjeks i enga? Enkeltpanter kan dras opp.
		Lyssiv / Knappsisv Sivfamilien Fleirårig Frøspreiing og korte underjordiske utløparar	Kjemisk: fenoksysyrer; mekoprop/MCPA. God verknad det meste av vekstsesongen. På grunn av behandlingsfrist kan sprøyting etter ei avbeiting vera eit praktisk tidspunkt. Mekanisk: gjentatt beitepussing. Best verknad midtsommar-haust
		Sølvbunke Grasfamilien Fleirårig Frøspreiing og korte underjordiske utløparar	Kjemisk: forsiktig, skjerma punktsprøyting med glyfosat-preparat. Mekanisk: beitepussing og evt. maskinell fjerning av store tuer. Så i nytt frø etter glyfosatsprøyting og fjerning av daude tuer.



Einstape Bregne Fleirårig Spreiing med underjordiske utløparar og sporer ("frø") Giftig	Kjemisk: Gratil når blada er fullt utvikla i juli. Glyfosat . Gjenta sprøyting på gjenvekst. Mekanisk: utarming ved gjentatt avpussing / slått. Helst to gonger årleg eller meir.
---	--